

Gebrauchshinweise

BioGrow - BioBloom

BioGrow und BioBloom müssen in das Substrat eingemischt oder als Topdressing (Oberflächendüngung) aufgetragen werden. Beide Produkte können in Erde, Coco oder ähnlichen Substraten eingesetzt werden.

Die Nährstoffe werden über einen Zeitraum von 8 Wochen konstant freigesetzt.

Dosierung BioGrow

Vegetatives Wachstum: 3 - 5g/L Substrat
Mutterpflanzen: 3 - 5g/L Substrat alle zwei Monate (als Oberflächendüngung)

Wenn die Wachstumsperiode weniger als 8 Wochen beträgt oder das Substrat vorgedüngt ist, sollten die Mengen reduziert werden.

Ist die Wachstumsperiode länger, ist eine zweite Anwendung erforderlich (als Oberflächendüngung).

Dosierung BioBloom

8 Woche Blütezeit: 1^{te} Woche = 3 - 5g/L Substrat
10 Woche Blütezeit: 1^{te} Woche = 3 - 5g/L Substrat
 3^{te} Woche = 1 - 2g/L Substrat
12 Woche Blütezeit: 1^{te} Woche = 3 - 5g/L Substrat
 5^{te} Woche = 1 - 2g/L Substrat

Die empfohlenen Dosierungen können für schwach zehrende Pflanzen und vorgedüngte Böden reduziert oder für stark zehrende Pflanzen erhöht werden.

BioEnhancer

Mischen Sie Enhancer mit Wasser und fügen Sie es beim Gießen einmal alle zwei Wochen zu. Kann während des gesamten Zyklus (vegetatives Wachstum und Blüte) verwendet werden. Verwenden Sie den Enhancer nach dem Umtopfen für eine bessere Wurzelentwicklung.

Innerhalb von 24 Stunden nach dem Mischen verwenden!

Dosierung Enhancer


Die Zugabe des Enhancers zu Wasser erhöht den pH-Wert auf etwa 8,5. Bei der Verwendung als Blattspray oder als Zugabe zum Gießwasser bei Erde ist es nicht notwendig, den pH-Wert zu korrigieren. Bei der Verwendung mit Gießwasser für Coco empfehlen wir, den pH-Wert vor der Zugabe von Enhancer auf 5.0 zu regulieren.

Anwendung beim Gießen:
 0,5 - 1g pro Liter Wasser alle zwei Wochen.

Stecklingsbewurzelung:
 Tauchen Sie das Medium in eine Lösung mit 0,25 - 1g pro Liter Wasser ein, bevor die Stecklinge eingesetzt werden.

Keimung von Samen:
 Lassen Sie die Samen in einer Lösung von 0,25 - 1g pro Liter Wasser für 8 - 12 Stunden einweichen.

Anwendung als Blattspray:
 Mischen Sie 3 - 5g mit 10 Liter Wasser und tragen Sie es alle zwei Wochen während der vegetativen Phase auf. Für Mutterpflanzen 24 Stunden vor der Aufnahme neuer Stecklinge anwenden.



Eine zweite Anwendung von BioBloom ist nur bei Pflanzen mit langer Blütezeit erforderlich.

